

# Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie

<http://piwmlawa.pl/iwm/aktualnosci/10251,Komunikat-MWLW-w-sprawie-akcji-szczepienia-lisow-wolno-zyjacych-przeciwno-wsciek.html>  
12.09.2024, 08:27

## Komunikat MWLW w sprawie akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliznie w dniach od 9 do 20 września 2023 r.

---

### Metadane

Data publikacji : 25.08.2023

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:  
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Osoba udostępniająca informację:  
Piotr Baran

---

[Poprzedni Strona](#)  
[Następny Strona](#)

**UWAGA • UWAGA • UWAGA**  
**KOMUNIKAT**  
**MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO**  
**LEKARZA WETERYNARI**

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliznie (Dz. U. poz. 1737)

**OGŁASZAM**

że w dniach od 9 do 20 września 2023 r.  
planowane jest przeprowadzenie

**AKCJI SZCZEPIENIA DOUSTNEGO LISÓW**  
**WOLNO ŻYJĄCYCH**  
**PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE**  
na terenie województwa mazowieckiego

- Szczepionka będzie rozdawana z nasadźców oraz wykładana ręcznie w ilości 30 sztuk na 1 km<sup>2</sup> na całym obszarze objętym szczepieniem.
  - Zwierzę objęte kompletną kłosem, pupa i kocię z pominięciem słownie wyselekcjonowanych i kłosem zakładowym.
  - Długość szczepionki stanowi podziałki, które można bezpiecznie i łatwo wyjąć z opakowania.
  - Działanie szczepionki przez czelownię spowoduje, że nie zostanie ona podjęta przez lis.
  - Szczepionka wykazuje działanie wspierające tylko u lisów.
  - Każdy kontakt człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza medycyny.
  - Każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii.
  - Zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki w okresie 14 dni od jej wykonania należy ograniczyć oblotowe pobawania.
  - Po wykonaniu szczepionki przez 14 dni jej należy gromadzić na szczepionki w klatkach lub w specjalnych pojemnikach.
- \*Szczepionki nie należy gromadzić w pojemniku w temperaturze otoczenia ani w temperaturze poniżej 10°C i powyżej 20°C.

Szczepienie doustne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliznie